

Fecha Cateterismo

dd mm año

STENT  
convencional



STENT liberador  
de medicamentos

adhesivo y número

adhesivo y número

Por favor, consigne con una  la casilla correspondiente

**¡¡muy importante!!**



**Paciente portador de  
prótesis vascular intracoronaria  
STENT**

**Sr/Sra:**



Durante su estancia en el hospital le han sido implantados **STENTS** coronarios

Estas pequeñas **prótesis metálicas** precisan de continuar un tratamiento para evitar la obstrucción de las mismas, que consiste en:

### MEDICACIÓN



**Aspirina 100mg**  
(Indefinidamente)



**Ticagrelor 90mg**  
(Brilique)



**Clopidogrel 75mg**  
(Plavix, Iscover)



**Prasugrel 10mg**  
(Efient)



El tratamiento pautado debe tomarse durante al menos un año para prevenir la trombosis del **stent** (obstrucción) y en algunos casos de forma indefinida.

La obstrucción del **stent** puede suceder cuando no se toma esta medicación y las consecuencias pueden ser muy graves para su salud.

**No debe suspender el tratamiento sin antes consultar con el cardiólogo.**

No deje de tomar la medicación tanto si se encuentra bien, como si tiene algún otro problema de salud.

Si se le dice que deje de tomar la medicación para realizarle algún tipo de intervención o procedimiento dental, **NO LO HAGA** y póngase en contacto con el equipo que le atendió.



**Lleve una vida saludable**